

# Strepsils Intensive na ból gardła 24 pastylki do ssania



cena: 31,23 pln

## Opis słownikowy

Cześć ciała	gardło
Działanie	przeciwbólowe, przeciwzapalne
Opakowanie	24 sztuk
Postać	pastylka
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	flurbiprofen
Wskazania	ból

## Opis produktu

### Opis

Strepsils Intensive Lek o silnym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym w leczeniu bólu gardła.

### Skład

Jedna tabletkę do ssania zawiera: 8,75 mg flurbiprofenu, syrop sacharozowy, syrop glukozowy, makrogol 300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, miód.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Jedną tabletkę do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby. Tabletki należy ssać powoli.

Nie stosować więcej niż 5 tabletek do ssania w ciągu doby.

W czasie ssania położenie tabletki w ustach należy zmieniać, by uniknąć miejscowego podrażnienia.

Jeśli po 3 dniach objawy bólu nie przemijają lub nasilają się, a także jeśli wystąpią nowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarza.

### Działanie

Strepsils Intensive zawiera flurbiprofen, substancję o silnym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym w leczeniu bólu gardła. Działa w miejscu powstawania ostrego bólu gardła.

### Wskazania

Krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła.

### Przeciwwskazania

Leku Strepsils Intensive nie należy stosować u pacjentów:

z nadwrażliwością na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub któregośkolwiek z niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały

kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, trudności z oddychaniem (astma oskrzelowa), wysypką, z istniejącą lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z ciężkim zapaleniem jelita grubego, z zaburzeniami krzepnięcia krwi, przyjmujących jednocześnie inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory cyklooksigenazy 2, takie jak celekoksyb), z ciężką niewydolnością serca,

Działania niepożądane

Reakcje nadwrażliwości:

Niezbyt często: reakcje skórne,

Rzadko: astma, niespodziewane trudności w oddychaniu, lub duszność, obrzęk twarzy, warg lub języka

Bardzo rzadko: omdlenia

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból brzucha, nudności, biegunka

Niezbyt często: niestrawność, wymioty, wzdęcia

Zaburzenia w obrębie jamy ustnej

Bardzo często: uczucie gorąca/palenia w ustach,

Często: mrowienie w ustach, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bóle głowy, zawroty głowy

Rzadko: uczucie senności lub bezsenność

Zaburzenia serca:

W związku z leczeniem NLPZ w dużych dawkach mogą wystąpić obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

#### **Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

#### **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży**

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

#### **Producent**

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

Dansom Lane

Hull HU8 7DS, UK