

## Succus Echinaceae Phytopharm płyn 50 ml



cena: 9,97 pln

### Opis słownikowy

Cześć ciała	układ odpornościowy
Działanie	wzmacniające
Opakowanie	50 ml
Postać	płyn
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Echinacea purpurea
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	osłabienie odporności, przeziębienie

### Opis produktu

#### Opis:

Produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Tradycyjnie stosuje się:

wspomagająco w przeziębieniach, do krótkotrwałego zastosowania profilaktycznego, w celu zmniejszenia podatności na infekcje w okresach wzmożonych zachorowań.

#### Skład:

W 100 ml płynu znajduje się 100 ml soku ze świeżego ziela jeżówki purpurowej, stabilizowanego etanolem (Echinaceae purpureae herbae recentis succus) (1:1).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda.

Zawartość etanolu w produkcie: 20-30% (V/V).

#### Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 3 - 4 razy dziennie po 2,5 ml.

Młodzież od 12 lat: 1 ml 3 razy dziennie.

Przyjmować codziennie przez 10 dni.

Powtórzenie kuracji po konsultacji z lekarzem.

Leczenie najlepiej rozpocząć po pojawieniu się pierwszych objawów przeziębienia.

#### Przeciwwskazania:

Kiedy **nie stosować** leku Succus Echinaceae:  
w przypadku chorób **alergic**znych (np. pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma),  
w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny złożonych (Asteraceae/Compositae).  
u dzieci poniżej 12 lat.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Dawka jednorazowa preparatu 2,5 ml zawiera 0,58 g etanolu co odpowiada ok. 6 ml wina i 15 ml piwa.  
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni C.  
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

**Stosowanie innych leków:**

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

**Ciąża i karmienie piersią:**

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

Po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.