

Supremin MAX syrop 1,5 mg/ml 150 ml



cena: 25,04 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe
Działanie	przeciwkaszlowe
Opakowanie	1 but. po 150 ml
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Butamiratum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel, kaszel suchy

Opis produktu

Opis:

Supremin MAX to produkt leczniczy do stosowania w przypadku kaszlu suchego (nieproduktywnego) o działaniu przeciwkaszlowym.

Skład:

Substancją czynną jest: butamirat (Butamirati citras).

1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu.

Substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 211), sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), glicerol, sacharyna sodowa (E 954), aromat pomarańczowy płynny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Działanie:

Supremin MAX zawiera butamirat - substancję czynną o działaniu przeciwkaszlowym (działającą ośrodkowo), należącą do nieopiodowych leków przeciwkaszlowych. Dodatkowo Supremin łagodnie rozszerza oskrzela ułatwiając oddychanie, łagodzi kaszel dorosłych i dzieci.

Wskazania:

Leczenie objawowe ostrego i nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Nie stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Do opakowania dołączona jest miarka.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Supremin MAX:

w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną - cytrynian butamiratu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

jeśli pacjent ma objawy ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego,

u kobiet w I trymestrze ciąży.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

nudności, biegunka,

pokrzywka,

zawroty głowy, senność.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Lek zawiera sorbitol - stosowanie tego leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.

Ze względu na zawartość sorbitolu, lek może mieć łagodne działanie przeczyszczające.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.