

Supremin syrop 4 mg/5ml 200 ml



cena: 16,95 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	drogi oddechowe
Działanie	przeciwkaszlowe
Opakowanie	1 but. po 200 ml
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Butamiratum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	kaszel, kaszel suchy

Opis produktu

Opis:

Supremin to produkt leczniczy o działaniu przeciwkaszlowym (zmniejsza częstość kaszlu) do stosowania w przypadku kaszlu suchego, nieproduktywnego, ostrego.

Skład:

Substancją czynną jest: butamirat (Butamirati citras).

5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera 4 mg cytrynianu butamiratu.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, kwas benzoesowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, maltitol ciekły, aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493), woda oczyszczona.

Działanie:

Supremin zawiera butamirat, który swoje działanie przeciwkaszlowe opiera na hamowaniu ośrodka kaszlu na poziomie rdzenia przedłużonego. Butamirat to nieopioidowy lek przeciwkaszlowy o działaniu ośrodkowym. Dodatkowo nieznacznie wpływa również na mięśnie oskrzeli - rozkurcza je.

Wskazania:

Leczenie objawowe kaszlu ostrego i suchego.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Lek zażywać przed posiłkami.

Do opakowania dołączona jest miarka (1 łyżeczka miarowa to 5 ml).
Leku nie stosować dłużej niż kilka dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Supremin:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli pacjent cierpi na fenyloketonurię.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

wysypka,
nudności, biegunka,
zawroty głowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeśli działania niepożądane (zaburzenia żołądkowo-jelitowe, reakcje alergiczne) nie ustępują po zmniejszeniu dawki, stosowanie leku należy przerwać.

Leku Supremin nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami ośrodka oddechowego.

Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Lek nie powinien być stosowany u chorych z fenyloketonurią.

Lek zawiera kwas benzoesowy i parahydroksybenzoesan metylu - substancje mogące powodować reakcje alergiczne, również typu późnego.

Lek zawiera maltitol ciekły - w przypadku stwierdzonej nietolerancji pewnych cukrów, stosowanie leku omówić z lekarzem.

Ze względu na zawartość maltitolu, lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.