

Uniben aerozol 30ml



cena: 12,19 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------------------|--|
| Cześć ciała | dziąsła, gardło, jama ustna |
| Działanie | odkażające, przeciwbólowe, przeciwzapalne, znieczulające |
| Opakowanie | 30 ml (butelka) |
| Postać | aerozol |
| Producent | ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY |
| Sposób aplikacji | w jamie ustnej |
| Substancja czynna/dawka | Benzydaminum |
| Wskazania | ból, podrażnienie, stan zapalny, zaczerwienienie |

Opis produktu

Opis:

Uniben zawiera substancję czynną – benzydaminę chlorowodork z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), która działa miejscowo przeciwzapalnie, przeciwbólowo, znieczulająco oraz odkażająco.

Dzięki temu, że lek miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym, dolegliwości szybko ustępują. Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

Skład:

Substancją czynną leku jest benzydaminę chlorowodork (1,5 mg na 1 ml leku).

Pozostałe składniki to: glicerol, sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbitat 20, aromat miętowy (aromat „fresh peppermint” 506041 T), woda oczyszczona.

Wskazania:

Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Uniben stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła.

Dzieci poniżej 6 lat:

1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę.

Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

Dzieci od 6 do 12 lat:

Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Dzieci i młodzież powyżej 12 lat oraz dorośli:

Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Jedna dawka leku o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów benzydaminu chlorowodoru.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie leku, zwłaszcza długotrwałe, może spowodować uczulenie. W przypadku braku poprawy po krótkotrwałym stosowaniu leku należy poradzić się lekarza.