

Venoforton płyn 125 ml



cena: 23,69 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	układ krwionośny, żyły
Działanie	przeciwobrzękowe, uszczelniające
Opakowanie	125 g
Postać	płyn
Producent	TADEUSZ POLAŃSKI PRZEDS. FARMACEUTYCZNE "LEKI NATURY"
Sposób aplikacji	doustnie
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	żylaki

Opis produktu

Opis:

Venoforton jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym w objawach niewydolności żyłnej (uczucie ciężkości i obrzęki nóg, żylaki), krążenia obwodowego (redukuje objawy zimnych nóg i drętwienia palców, pomocniczo w miażdżycy), łagodnie w niewydolności krążenia mózgowego (zawroty głowy, szumy uszne, osłabienie pamięci, zmniejszona koncentracja umysłowa).

Skład:

Produkt leczniczy Venoforton zawiera następujące substancje czynne (na 100 g produktu):

Wyciąg z owoców kasztanowca (*Hippocastani fructus intractum recentis*) DER 1:1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 40 g; Nalewka z miłorzębu (*Ginkgo bilobae folium tinctura*) DER 1:5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V) 37 g; Nalewka z kwiatostanu głogu (*Crataegi inflorescentia tinctura*) DER 1:5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 60% (V/V) 10 g; Wyciąg z ziela jemioli (*Visci herbae intractum*) DER 1:1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 10 g; Nalewka z ziela arniki (*Arnicae herbae tinctura*) DER 1:5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V) 3 g.

Zawartość etanolu: 55-70% (V/V)

Wskazania do stosowania:

uczucie ciężkości i obrzęki nóg, żylaki
objawy zimnych nóg i drętwienia palców
pomocniczo w miażdżycy
zawroty głowy
szumy uszne
osłabienie pamięci
zmniejszona koncentracja umysłowa

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:



4 ml leku 3 razy na dobę.

Dzieci poniżej 12 lat:

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

Płyn przeznaczony do podania doustnego.

Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.