

Vicks AntiGrip Complex cytryna 10 saszetek

cena: 20,46 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	gardło, głowa, mięśnie, stawy
Działanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
Opakowanie	10 sasz.
Postać	prosz.do sporz.roztw.doust.
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Paracetamolum, Guaifenesinum, Phenylephrini hydrochloridum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, gorączka, grypa, kaszel mokry, katar, przeziębienie

Opis produktu

Opis:

Męczy Cię wiele objawów przeziębienia i grypy? Infekcja dróg oddechowych sprawia, że czujesz, jakby były zablokowane? Walcz z objawami przeziębienia i grypy przy pomocy jednego leku!

Vicks AntiGrip Complex zawiera 3 substancje czynne, które pozwalają walczyć z aż 6 objawami przeziębienia lub grypy:

- Ból głowy
- Ból ciała
- Ból gardła
- Gorączka
- Zatkany nos
- Kaszel z odkrztuszaniem

Lek Vicks AntiGrip Complex zawiera 3 substancje czynne:

- Paracetamol - dobrze znana substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym,
- Gwajafenezyna - rozrzedza wydzielinę znajdującą się w oskrzelach, ułatwiając jej odkrztuszanie w kaszlu mokrym,
- Fenylefryna - zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa i w ten sposób umożliwia udrożnienie zatkanego nosa.

Lek Vicks AntiGrip Complex jest dostępny w opakowaniu zawierającym 10 saszetek.

Skład www.apteka.fit

1 saszetka zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny, 10 mg fenylefryny chlorowodorku.

Wskazania:

krótkotrwałe, doraźne łagodzenie objawów, takich jak ból o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, gorączka, przekrwienie błony śluzowej nosa, kaszel produktywny (tzw. mokry kaszel), związany z przeziębieniem, dreszczami i grypą.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje czynne paracetamol, gwajafenezynę, fenylefryny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; zaburzenia czynności wątroby lub ciężkie zaburzenia czynności nerek; nadciśnienie tętnicze; nadczynność tarczycy; cukrzyca; choroba serca; jaskra z wąskim kątem przesączania; porfiria; stosowanie u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; stosowanie u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminoooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni; stosowanie u pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne; stosowanie u pacjentów przyjmujących aktualnie inne leki sympatykomimetyczne; dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Uwaga: Nie należy przyjmować jednocześnie kilku produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania w przeziębieniu i grypie, zawierających te same substancje czynne. Szczegóły zawarte są w ulotce.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.