

Vicks Antigrip Max 10 saszetek



cena: 20,53 pln

Opis słownikowy

Opakowanie	10 sasz.
Postać	gran.do sporz.roztw.doust.
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Substancja czynna/dawka	Paracetamol, Phenylephrinum, Chlorpheniraminum

Opis produktu

Opis:

Vicks AntiGrip Max to produkt leczniczy stosowany do leczenia objawów przeziębienia i grypy. Vicks AntiGrip Max zawiera 3 substancje czynne: paracetamol, fenylefrynę oraz chlorfenaminę. Takie połączenie łagodzi ból i gorączkę, zmniejsza ilość wydzieliny z nosa a także zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), fenylefryny wodorowinian (Phenylephrini hydrogenotartras) i chlorfenaminy maleinian (Chlorphenamini maleas).

1 saszetka zawiera: 1000 mg paracetamolu, 5,58 mg fenylefryny wodorowinianu, (czyli 8,21 mg fenylefryny), 4 mg chlorfenaminy maleinianu (co odpowiada 2,8 mg chlorfenaminy).

Substancje pomocnicze: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958.

Działanie:

Vicks AntiGrip Max zawiera 3 składniki aktywne:

paracetamol - działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo,

fenylefrynę - powoduje zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa i zatok przynosowych,

chlorfenaminę - zmniejsza ilość wydzieliny w nosie.

Wskazania:

Vicks AntiGrip Max jest wskazany podczas leczenia objawowego przeziębienia i grypy, które przebiegają z:

gorączką,

słabym lub umiarkowanym bólem głowy, mięśni, gardła zatok,

obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z tworzeniem wydzieliny.

Sposób użycia:

Lek do podawania doustnego.

Przygotowanie roztworu: Zawartość saszetki należy rozpuścić w połowie szklanki gorącej (nie wrzącej) wody. Po przestudzeniu należy wypić.

Dorośli: jedna saszetka co 6-8 godzin.

Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

Dorośli o masie ciała poniżej 50 kg, pacjenci: odwodnieni, długotrwale niedożywieni, z przewlekłą chorobą alkoholową, z zespołem Gilberta: 1 saszetka 2-3 razy na dobę (co 6-8 godzin).

Jeżeli gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, objawy ulegają nasileniu lub pojawiają się nowe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Vicks AntiGrip Max:

w przypadku pacjentów uczulonych na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

u dzieci, z uwagi na dużą zawartość paracetamolu;

jeśli pacjent choruje na: jaskrę, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, ciężką niewydolność nerek;

jeśli pacjent cierpi na jakąkolwiek ciężką chorobę serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa);

jeśli u pacjenta stwierdzono tachykardię (zbyt szybkie bicie serca);

u pacjentów w podeszłym wieku bez konsultacji z lekarzem (może wystąpić bradykardia (wolne bicie serca) lub zmniejszenie pojemności minutowej serca);

u pacjentów leczonych lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, (IMAO) oraz w okresie 15 dni po ich odstawieniu.