

## Xedine HA 0,5mg/ml aerozol dla dzieci 10 ml



cena: 11,60 pln

### Opis słownikowy

Cześć ciała	nos
Działanie	nawilżające, oczyszczające, udrażniające nos
Opakowanie	10 ml
Postać	aerozol
Producent	RANBAXY POLAND SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	do nosa
Substancja czynna/dawka	Xylometazolinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	katar

### Opis produktu

#### Opis:

Xedine jest lekiem, który dzięki optymalnej kompozycji: chlorowodoru ksylometazoliny, kwasu hialuronowego i wody morskiej, ma moc potrójnego działania: leczy, nawilża i oczyszcza błonę śluzową nosa.

#### Skład:

5 ml leku zawiera: substancję czynną: 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodoru, pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: woda morską oczyszczoną, potasu diwodorofosforan, sodu hialuronian, woda oczyszczona.

Jedna dawka (70µl) zawiera 0,035 mg ksylometazoliny chlorowodoru.

#### Wskazania i działanie:

Xedine HA o mocy 0,5 mg/ml jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Substancją czynną leku jest chlorowodorek ksylometazoliny, który pomaga zwęzić naczynia krwionośne w nosie, zmniejszając tym samym obrzęk błony śluzowej nosa. W składzie leku znajduje się również kwas hialuronowy, który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

Xedine HA ma postać bezbarwnego, sterylnego roztworu bez konserwantów. Plastikowa butelka zawiera pompkę dozującą z aplikatorem do nosa i ochronną nasadkę.

#### Sposób użycia:

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

1 rozpylenie do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. Leku nie wolno stosować dłużej niż przez 5 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Przed ponownym zastosowaniem leku należy odczekać kilka dni.

W przypadku przewlekłego przeziębienia ten lek można stosować tylko pod kontrolą lekarza, aby zapobiec zanikowi (ścięczeniu) błony śluzowej nosa.

Nie wolno stosować dawki większej niż zalecana.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie Xedine HA z inhibitorami monoaminoooksydazy (inhibitorami MAO, np. tranilcypromina, moklobemid) lub stosowanie w ciągu ostatnich dwóch tygodni inhibitorów MAO, trójpierścieniowych lub czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub innych leków, które mogą powodować podniesienie ciśnienia tętniczego krwi (np. doksapram, ergotamina, oksytocyna), może w efekcie działania tych leków na serce i naczynia krwionośne powodować podniesienie ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków.

Nie zaleca się stosowania tego leku w skojarzeniu z lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi (np. metyldopa), ze względu na możliwość podniesienia ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto mogą wystąpić złożone interakcje z lekami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne i beta-adrenergiczne, powodujące obniżenie lub podwyższenie ciśnienia krwi oraz przyspieszenie lub spowolnienie bicia serca.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.