

Xylometazolin 0,1% krople do nosa 10 ml



cena: 8,01 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	nos
Działanie	łagodzące, wspomagające
Opakowanie	10 ml (butelka)
Postać	krople
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.
Sposób aplikacji	do nosa
Substancja czynna/dawka	Xylometazolini hydrochloridum
Wskazania	katar, obrzęk, zapalenie

Opis produktu

Opis:

Lek stosowany w leczeniu pomocniczym: ostrego nieżytu nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu udrożnienia trąbki słuchowej.

Skład:

Substancja czynna: chlorowoderek ksylometazoliny.

1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodoru ksylometazoliny.

Substancje pomocnicze: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, sorbitol, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 do 3 kropli do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin.

Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.

Ze względów higienicznych opakowanie powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Xylometazolin (WZF) 0,1%

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu,
w zanikowym zapaleniu błony śluzowej nosa,

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 osób):

ból głowy, bezsenność
nudności,
osłabienie, zmęczenie
reakcje alergiczne

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Okres ważności produktu po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 tygodni.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Chronić od światła.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.